

# БЕНФИ

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Бенфи.

**Международное непатентованное название:** Бензоил Пероксид.

**Лекарственная форма:** гель для наружного применения.

**Состав:**

Водный Бензоил Пероксид ВР

экв. Безводному Бензоил Пероксиду

5,0 % w/w;

Водяная гелевая основа

q.s.

**Фармакотерапевтическая группа:**

**Код АТХ:** D10AE01.

**Фармакологическое действие:**

*Фармакодинамика:*

Препарат обладает высокой противомикробной активностью в отношении *Propionibacterium acnes* и *Staphylococcus epidermidis*, оказывает комедонолитическое и противовоспалительное действие, улучшает оксигенацию тканей, подавляет продукцию кожного сала в сальных железах, абсорбирует избыток сального секрета и увлажняет кожу.

Бензоил пероксид, являясь мощным окислителем, оказывает сильное бактерицидное действие на микроорганизмы; при этом микроорганизмы не способны вырабатывать устойчивые к бензоил пероксиду штаммы.

В исследованиях *in vivo* по результатам посева было показано, что подавление роста культуры *Propionibacterium acnes* на 94% отмечается на 7-й день, а на 15-й день - на 97-99%.

Противовоспалительное действие бензоил пероксида основано на инактивации свободных радикалов в очаге воспаления и ингибирования свободных жирных кислот.

*Фармакокинетика:*

Большая часть бензоил пероксида биотрансформируется в бензойную кислоту (95%) в коже человека; неизменная бензойная кислота быстро выводится с мочой. Данных о кумуляции в тканях нет. У препарата не выявлено системного действия.

**Показания к применению:**

- подавляет рост бактерий, которые вызывают появление прыщей и угрей;
- рассасывает уже имеющиеся комедоны, препятствуя формированию новых;
- снижает образование жира сальными железами кожи;
- улучшает питание тканей и увеличивает доставку кислорода к поверхностным кожным покровам.

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 12 лет.

**Способ применения и дозы:**

Препарат следует наносить на чистую и сухую поверхность пораженных участков кожи 1 или 2 раза в сутки (утром или вечером). Курс лечения - 3 месяца. Терапевтический эффект развивается через 4 недели после начала применения препарата. Стойкое улучшение наступает через 3 месяца терапии.

При необходимости возможно проведение повторного курса лечения.

**Побочные действия:**

*Редко:* раздражение кожи в месте нанесения препарата, сухость кожи, аллергические реакции.

Отсутствуют данные о развитии системных побочных эффектах при наружном применении препарата Бенфи в рекомендованных дозах.

**Передозировка:**

*Симптомы:* при случайном нанесении большого количества препарата на кожу возможно возникновение сильного раздражения в месте нанесения.

*Лечение:* препарат следует отменить и проводить симптоматическую терапию.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данных о лекарственном взаимодействии препарата Бенфи, применяемого по показаниям и в рекомендуемых дозах, с другими лекарственными средствами для наружного и системного применения в настоящее время нет.

**Особые указания:**

При появлении раздражения кожи после нанесения геля, Бенфи следует отменить.

Не рекомендуется наносить гель на участки кожи с повреждением целостности кожных покровов.

При случайном попадании препарата на слизистую оболочку глаз, рта или носа, следует тщательно промыть ее теплой водой.

В период применения препарата следует избегать попадания на места его нанесения прямых солнечных лучей, т.к. это может вызвать раздражение кожи.

В период применения Бенфи не рекомендуется одновременное использование подсушивающих или раздражающих средств (духи или этанолсодержащие средства).

**Форма выпуска:**

Гель 20 г в тубике. Один тубик вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C и в местах недоступных для детей.

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.