

ДЕСОЛАЙТ

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Десолайт.

Международное непатентованное название: Мометазона фураат + Гидрохинон + Третиноин.

Лекарственная форма: крем для наружного применения.

Состав: каждый грамм содержит:

Мометазона фураат USP	1 мг;
Гидрохинон USP	20 мг;
Третиноин USP	0,25 мг;
В кремовой основе	q.s.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Сочетание средств Десолайт крема действуют путем ингибирования одной или более стадий образования в тирозин-тирозины путем воздействия на меланин. Гиперпигментированные области исчезают быстро у 80% пациентов с меланодермией.

Гидрохинон устраняет возрастные пятна, поскольку снижает выработку меланина. Это достигается путём блокировки фермента тирозиназы, необходимого для формирования меланина.

Третиноин подтягивает и разглаживает кожу, поскольку обладает способностью восстанавливать ее верхний слой.

Мометазона фураат является мощным синтетическим кортикостероидом с противовоспалительной активностью для местного применения. Тормозит выработку медиаторов воспаления, а также повышает продукцию липомодулина, который является ингибитором фосфолипазы А. Это способствует блокировке высвобождения арахидоновой кислоты, следовательно, угнетается синтез продуктов метаболизма арахидоновой кислоты – простагландинов, циклических нуклеотидов.

Мометазон препятствует краевому экспонению нейтрофилов, что уменьшает продукцию лимфокинов и воспалительный экссудат, тормозит перемещение макрофагов, приводя к уменьшению процессов грануляции и инфильтрации.

Фармакокинетика:

Нет данных.

Показания к применению:

Для кратковременного лечения умеренных и тяжелых форм меланодермии кожи лица. Во время лечения следует избегать УФ лучей и использовать солнцезащитный крем.

Противопоказания:

- гиперчувствительность к составу препарата;
- беременность;
- детям до 12 лет.

С осторожностью использовать Десолайт крем кормящим женщинам.

Способ применения и дозы:

Перед нанесением крема для чувствительной кожи необходимо предварительно попробовать на участке кожи руки, если кожа покраснеет, воспалится, значит необходимо немедленно прекратить использование крема.

Десолайт крем следует наносить один раз в день на ночь. Нанести крем за 30 минут до сна. Немного крема следует нанести на область гиперпигментации меланодермии в том числе на нормальную кожу вокруг каждого поражения.

Для тяжелой формы меланодермии лица продолжительность лечения до 8 недель.

Препарат предназначен для кратковременного лечения (не более 8 недель).

Применение:

Бережно вымойте лицо с мягким моющим средством, высушите лицо.

Крем наносят тонким слоем на кончике пальца на предварительно очищенную пораженную область кожи и на нормальную кожу вокруг пораженной области и осторожно втирают. Крем должен сразу впитаться, если крем остался на поверхности значит было использовано много крема.

Не следует использовать больше крема или применять его чаще, чем рекомендовано вашим врачом. Слишком много крема может раздражать кожу и не дать никаких результатов.

Во время лечения используйте солнцезащитный крем с защитой SPF 30 и носите широкополую шляпу или зонтик для защиты от солнца.

Побочные действия:

Возможны: эритема, шелушение, жжение, зуд, раздражение, сухость, гипопигментация, периоральный дерматит, аллергический контактный дерматит, вторичная инфекция и атрофия кожи в месте применения.

Передозировка:

При передозировке могут наблюдаться случаи покраснения, шелушения или дискомфорта. Передозировка не приводит к достижению лучших результатов.

Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Третиноин может быть несовместим с некоторыми препаратами местного использования, обычным, медицинским и образным мылом, очищающими средствами, косметикой имеющими сильный высушивающий эффект, спиртосодержащими продуктами, вяжущими средствами, специями и цитрусовыми. Необходимо быть особенно осторожным при использовании препаратов, содержащих серу, резорцин или салициловую кислоту.

Мометазона фураат несовместим по химическому свойству со щелочами.

Другие взаимодействия не описаны.

Особые указания:

Можно использовать увлажняющий крем и косметику в течение дня.

Избегать контакта крема с глазами и слизистыми оболочками.

Воздействие солнечного света или ультрафиолетового света вызовет репигментацию отбеленной области.

Форма выпуска:

Крем 5 г в алюминиевой тубе. Одна туба вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30°С и в местах недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

По рецепту врача.