

КЛОТРАВЕНС

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Клотравенс.

Международное непатентованное название: Клотримазол.

Лекарственная форма: таблетки вагинальные.

Состав: каждая вагинальная таблетка содержит:

Клотримазол USP 100 мг;

Вспомогательные вещества q.s.

Фармакотерапевтическая группа: противогрибковое средство.

Код АТХ: G01AF02.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Клотримазол - является производным имидазола. Противогрибковое средство широкого спектра действия. Эффект препарата связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что вызывает изменение ее структуры и свойств и приводит к лизису клетки.

К клотримазолу чувствительны дерматофиты, дрожжевые грибы (рода *Candida*, *Torulopsis glabrata*, рода *Rhodotorula*), плесневые грибы, а также возбудитель *Pityriasis versicolor* (разноцветного лишая) и возбудитель эризмозы.

Кроме того, оказывает антимикробное действие в отношении грамположительных (стафилококки и стрептококки) и грамотрицательных бактерий (*Bacteroides*, *Gardnerella vaginalis*), а также в отношении *Trichomonas vaginalis*, *Malasseria furfur*, *Corinebacterium minussumum*.

Фармакокинетика:

При применении клотримазола интравагинально резорбция составляет 3-10% введенной дозы. Высокие концентрации в вагинальном секрете и низкие концентрации в крови сохраняются в течение 48-72 часов. В печени быстро метаболизируется до неактивных метаболитов.

Показания к применению:

- генитальные инфекции, вызванные дрожжевыми грибами рода *Candida* и/или *Trichomonas vaginalis* (кандидозный вульвовагинит, трихомониаз);
- генитальные суперинфекции, вызванные бактериями, чувствительными к клотримазолу;
- санация родовых путей перед родами.

Противопоказания:

- гиперчувствительность к клотримазолу;
- период менструации;
- I триместр беременности.

С осторожностью - период лактации.

Способ применения и дозы:

Только для местного (вагинального применения).

Для *лечения вагинальных инфекций* назначают по 1 таблетке (100 мг) 1 раз в сутки (вечером). Вагинальные таблетки вводят как можно глубже во влагалище. Продолжительность лечения - 6 дней. При необходимости курс лечения может быть повторен.

При *наличии кандидозного вульвита или кандидозного баланита* рекомендуется одновременно назначать Клотравенс в виде крема, нанося его наружно 2-3 раза в сутки в течение 6-12 дней на пораженные области.

Для *санации родовых путей* рекомендуется однократное введение одной таблетки.

Побочное действие:

Зуд, жжение и отек слизистой оболочки влагалища, выделения из влагалища, головная боль, гастралгия, учащенное мочеиспускание, интеркуррентный цистит, ощущение жжения в половом члене у полового партнера, боль во время полового акта.

Передозировка:

При вагинальном введении клотримазол никогда не наблюдается, учитывая очень низкую всасываемость препарата при интравагинальном применении.

В случае непредусмотренного применения препарата (внутрь) возможны следующие *симптомы*: анорексия, тошнота, рвота, гастралгия, нарушение функции печени; редко - сонливость, галлюцинации, поллакиурия, кожные аллергические реакции.

Лечение: специфического антидота нет. Необходимо назначать внутрь активированный уголь. При необходимости лечение симптоматическое.

Лекарственные взаимодействия:

При вагинальном введении клотримазол снижает активность амфотерицина и других полиеновых антибиотиков. При одновременном применении с нистатином активность клотримазола может снижаться.

Особые указания:

Для предотвращения распространения урогенитальной инфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров. При трихомониазе для более успешного лечения совместно с препаратом Клотравенс следует назначать другие лекарственные средства, обладающие системным действием (например, метронидазол внутрь). Вагинальные таблетки не рекомендуется применять во время менструации.

У больных с печеночной недостаточностью следует периодически контролировать функциональное состояние печени.

При появлении признаков гиперчувствительности или раздражения лечение прекращают.

При отсутствии эффекта в течение 4 недель следует подтвердить диагноз.

Форма выпуска:

6 вагинальных таблеток в каждом блистере алу/алу. Один блистер вместе с аппликатором, и инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.