

ДВИЖЕКС

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Движекс.

Международное непатентованное название: Панкреатин + Диметикон.

Лекарственная форма: таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой.

Состав: каждая таблетка покрытая кишечнорастворимой оболочкой содержит:

Панкреатин ВР 170 мг;

Активированный Диметикон ВР 80 мг.

Фармакотерапевтическая группа: Ферментный препарат с компонентом, уменьшающим метеоризм.

Код АТХ: А09АА02.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Препарат компенсирует недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы.

Входящие в состав панкреатина ферменты амилаза, липаза и протеаза облегчают переваривание углеводов, жиров и белков, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике.

Диметикон средство, уменьшающее метеоризм. Уменьшает поверхностное натяжение находящихся в кишечнике газовых пузырьков, вызывая их распад.

Фармакокинетика:

В связи с тем, что *панкреатин* не всасывается и не определяется в плазме крови, привести данные о его фармакокинетике и биодоступности не представляется возможным.

Диметикон не абсорбируется в ЖКТ. Он выводится в неизменном виде с калом.

Показания к применению:

- для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией желудочно-кишечного тракта в случае погрешностей в питании;
- недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы (хронический панкреатит, муковисцидоз и пр.);
- хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря; состояния после резекции или облучения этих органов, сопровождающиеся нарушениями переваривания пищи, метеоризмом, диареей (в составе комбинированной терапии);
- подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованиям органов брюшной полости.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- острый панкреатит, обострение хронического панкреатита.

С осторожностью: беременность, детский возраст (только по назначению врача).

Способы применения и дозы:

Препарат применяют внутрь, не разжёвывая, во время или после еды.

Взрослые: по 1-2 таблетки с каждым приёмом пищи.

Дети: по назначению врача.

Побочное действие:

Аллергические реакции. При длительном применении в высоких дозах возможны развитие гиперурикозурии, повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови.

Передозировка:

О передозировке не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении панкреатина с препаратами железа возможно снижение всасывания последних. Одновременное применение антацидных средств, содержащих кальций карбонат и/или магния гидроксид, может привести к снижению активности панкреатина.

Особые указания:

Безопасность применения панкреатина при беременности изучена недостаточно. Применение возможно в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Форма выпуска:

10 таблеток покрытых кишечнорастворимой оболочкой в каждом блистере. 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C и в местах недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.