

МЕТРОВЕНС ГИНО

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Метровенс Гино.

Международное непатентованное название: Метронидазол + Неомицина сульфат + Нистатин.

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные.

Состав: каждый суппозиторий содержит:

Метронидазол ВР 500 мг;

Неомицина сульфат ВР 65 000 МЕ;

Нистатин ВР 100 000 МЕ;

Вспомогательные вещества q.s.

Фармакотерапевтическая группа: препарат с антибактериальным, противогрибковым и противовоспалительным действием для местного применения в гинекологии.

Код АТХ: G01BA.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Комбинированный препарат для местного применения в гинекологии. Действие препарата обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов.

Метронидазол – производное 5-нитроимидазола, оказывает противомикробное действие, эффективен относительно простейших. При взаимодействии с протеинами микроорганизмов 5-нитрогруппа Метронидазол восстанавливается и препятствует синтезу нуклеиновых кислот. Угнетение синтеза нуклеиновых кислот приводит к разрушению ДНК микроорганизмов и их гибели. Метронидазол эффективен относительно широкого спектра микроорганизмов и простейших, которые являются причиной вагинальных инфекций, в том числе *Gardnerella vaginalis*, *Streptococcus* spp. и *Trichomonas vaginalis*.

Неомицина сульфат – антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов. Действует бактерицидно.

Активен в отношении грамположительных (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus pneumoniae*) и грамотрицательных

(*Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii*, *Shigella sonnei*, *Proteus* spp.) микроорганизмов.

Нистатин – активен в отношении дрожжеподобных грибов рода *Candida*, изменяет проницаемость клеточных

мембран и замедляет их рост.

Фармакокинетика:

Исследования фармакокинетики препарата Метровенс Гино не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.

Показания к применению:

Лечение вагинитов, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами:

- бактериальный вагиноз;
- бактериальные вагиниты, вызванные банальной пиогенной или условно патогенной палочковой микрофлорой;
- трихомоноз влагалища;
- вагиниты, вызванные грибами рода *Candida*;
- смешанные вагиниты.

Профилактика вагинитов:

- перед гинекологическими операциями;

- перед родами или абортом;

- до и после установки ВМС;

- до и после дигестермоагуляции шейки матки;

- перед гистерографией.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Беременность и лактация:

Применение препарата Метровенс Гино при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в случае, когда потенциальная польза для матери превышает риск для плода или младенца.

Способ применения и дозы:

Назначают по 1 суппозиторию в сутки перед сном. Средняя продолжительность курса терапии - 10 дней; в случае подтвержденного микоза, терапия может быть увеличена до 20 дней. Не следует прекращать лечение во время менструации.

Вводят глубоко во влагалище в положении лежа. После введения необходимо находиться в горизонтальном положении в течении 10-15 мин.

Побочные действия:

Местные реакции: редко - чувство жжения, местное раздражение (особенно в начале терапии).

Прочие: крайне редко - аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

Лекарственные взаимодействия:

Клинически значимого лекарственного взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания:

При вагинитах и трихомониазе необходимо провести одновременное лечение полового партнера из-за опасности повторного заражения.

Форма выпуска: 5 суппозиториев в каждом блистере ПВХ. 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок хранения:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

По рецепту врача.