

# НЕОЛАЙК

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Неолайк.

**Международное непатентованное название:**

Ацеклофенак + Метилсалицилат + Льняное масло + Ментол + Капсацин.

**Лекарственная форма:** гель для наружного применения.

**Состав:** каждый грамм содержит:

Ацеклофенак ВР 6% w/w;

Метилсалицилат ВР 10% w/w;

Цельное льняное масло ВР 3% w/w;

Ментол ВР 1,5% w/w;

Капсацин USP 0,01% w/w;

Гелевая основа

**Фармакотерапевтическая группа:** средства для наружного применения при мышечной и суставной боли.

**Код АТХ:** M02AX10.

**Фармакологические свойства:**

**Фармакодинамика:**

Комбинированный препарат для наружного применения, действие которого обусловлено взаимным усилением терапевтических свойств компонентов, входящих в его состав. Оказывает местное анальгезирующее, противовоспалительное и противоотечное действие.

**Ацеклофенак** нестероидное противовоспалительное средство (НПВС). Подавляет образование простагландина E2 при воспалении. Снижают концентрацию простагландин H2, из которого под действием простагландин - изомеразы образуется простанглайдин E2. Снижение концентрации простанглайдина E2, приводит к уменьшению степени активности простаноидных рецепторов EP типа, что отражается в анальгезирующих и противовоспалительных эффектах. Фармакологическая активность ацеклофенака обусловлена его способностью селективно ингибировать активность фермента циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), который участвует в синтезе простагландинов при воспалении. При этом он не влияет, влияет очень мало, на другую изоформу ЦОГ - ЦОГ-1, благодаря чему уменьшается количество побочных эффектов.

**Метилсалицилат** вызывает местное раздражающее действие, покраснение кожи и способствует уменьшению чувства боли.

**Льняное масло** оказывает противовоспалительное, анальгетическое и обволакивающее действие.

**Ментол** при нанесении на кожу, вызывает раздражение нервных окончаний, что сопровождается развитием ощущения холода и анальгезирующим эффектом, а также приводит к сужению поверхностных кровеносных сосудов кожи и рефлекторного расширения сосудов внутренних органов.

**Капсацин** является алкалоидом, который выделяют из перца стручкового. При местном применении вызывает сильное раздражение чувствительных рецепторов кожи. Повышает местный кровоток, способствуя уменьшению уровня воспалительных простагландинов.

**Фармакокинетика:**

При наружном применении ацеклофенак, метилсалицилат, льняное масло, ментол и капсацин быстро абсорбируются и проникают в подкожную клетчатку, мышечную ткань, суставную капсулу и собственно в полость сустава.

**Показания к применению:**

Патологические состояния, характеризующиеся болевым синдромом и воспалением мышц, суставов, связок, сухожилий, в частности:

- ревматоидный артрит;
- анкилозирующий спондилоартрит;
- остеоартроз периферических суставов и позвоночника;
- ревматическое поражение мягких тканей;
- воспаление связок, сухожилий, бурсит;
- постстранныческие воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата (повреждения и разрывы связок, ушибы, спортивные травмы);
- боли в нижней части спины, радикулит;

• диабетическая нефропатия.

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к ацеклофенаку или другим НПВС, метилсалицилату, и к другим компонентам входящие в состав препарата;
- нарушение целостности кожного покрова;
- беременность и период кормления грудью;
- возраст до 16 лет (эффективность и безопасность применения у детей не исследовалась).

**С осторожностью** следует назначать при выраженных нарушениях функции печени и почек, при тяжелой хронической сердечной недостаточности, бронхиальной астме.

**Способ применения и дозы:**

Неолайк гель назначают только для наружного применения. Столбик геля длиной 2 см наносят (не втирая) на пораженный участок равномерным тонким слоем 3-4 раза в сутки. Одна доза составляет 2-3 г. Доза может варьироваться в зависимости от размеров пораженного участка и реакции на лечение. Продолжительность лечения не более 4 недель.

**Побочное действие:**

Местное раздражение, эритема, крапивница, десквамация в месте нанесения геля.

При возникновении любых побочных эффектов применения препарата следует прекратить.

**Передозировка:**

Случаи передозировки не выявлено.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Комплексное действие ацеклофенака, всасывающегося в кровь через кожу после местного применения геля невелико, кроме тех случаев, когда осуществляется лечение обширных участков в течение долгого периода, но о каких взаимодействиях данного препарата с другими лекарственными средствами не сообщалось. В любом случае, не следует использовать Неолайк гель в комбинации с другими лекарствами, содержащими ацеклофенак, и с осторожностью в сочетании с другими НПВС, т.к. увеличивается риск возникновения побочных эффектов. Перед началом применения Неолайк геля сообщите своему лечащему врачу или фармацевту о любых препаратах, которые вы принимаете в настоящий момент, включая гомеопатические и отпускаемые без рецепта препараты.

**Особые указания:**

Перед применением геля следует вымыть и высушить поверхность кожи.

Препарат следует наносить только на неповрежденную кожу, избегать попадания на открытые раны. Не следует применять под окклюзионную повязку. Не следует допускать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.

Препарат не рекомендуется назначать детям, поскольку эффективность и безопасность применения у детей не исследовалась.

**Форма и упаковка:**

Гель для наружного применения 30 г в алюминиевой тубе вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C и в местах недоступных для детей.

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности. Не замораживать.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.