

# ПРОКТОФАСТ

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Проктофаст.

**Международное непатентованное название:** комбинированный препарат.

**Лекарственная форма:** таблетки покрытые пленочной оболочкой.

**Состав:** каждая таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит:

Барбарис	30 мг;
Обработанный агат	5 мг;
Аморфофаллус пионolistный	60 мг;
Мезуя железная	34 мг;
Чистый алюминий	25 мг;
Амла	51 мг;
Ним	10 мг;
Сахар тростниковый	5 мг;
Мирра	17 мг;
Мелия азедарах	10 мг;
Драцена	10 мг;
Кассия узколистная	5 мг;
Янтарное масло	5 мг;
Ветивер	270 мг;

Разрешенные к употреблению консерванты и вспомогательные вещества q.s.

**Фармакотерапевтическая группа:** лечебно-профилактическое средство в комплексной терапии проктологических заболеваний.

**Код АТХ:** C05AX03.

**Фармакологическое действие:**

**Фармакодинамика:**

Растительный препарат Проктофаст благоприятно воздействует на состояние желудочной секреции, оказывает антисептическое, противомикробное, вяжущее действие, улучшает процессы пищеварения, усиливает перистальтику кишечника, обеспечивает мягкое и комфортное очищение кишечника, снимает зуд и боли как при сухом, так и при кровоточащем, геморрое, противодействует венозному застою, уменьшает варикозные узлы, оказывает антиоксидантное и капилляроукрепляющее действие, регулирует липидный обмен, улучшает функциональное состояние центральной нервной системы.

*Барбарис* - стимулирует свертывание крови, оказывая успокаивающее действие, обладает бактерицидным действием, тонизирует работу желудочно-кишечного тракта.

*Обработанный агат* – снимает зуд.

*Аморфофаллус пионolistный* - отлично очищает организм от шлаков, уменьшают уровень сахара и холестерина в крови, останавливает кровотечения, обладает анальгетическим действием, улучшает работу ЖКТ, имеет слабительное действие, которое предотвращает геморрой.

*Мезуя железная* - нормализует состояние желудочной секреции, оказывает антисептическое, противомикробное, вяжущее действие, улучшает процессы пищеварения.

*Чистый алюминий* - имеет обволакивающий, обезболивающий эффект, обладает антацидным и адсорбирующим действиями, имеет непосредственное отношение к восстановительным и регенерационным процессам, под его влиянием возрастает активность пищеварительных желез и ферментов.

*Амла* - содержит аскорбиновую кислоту, никотиновую кислоту, каротин, рибофлавин, тиамин, бромид, метионин, триптофан, кальций, железо, фосфор, дубильные вещества, пектины, флавоноиды, эфирное масло, жирное масло. Обладает антиоксидантным и иммуномодулирующим свойствами.

*Ним* – обладает противогрибковым, противобактериальным, успокоительным, вяжущими и общеукрепляющими свойствами.

*Сахар тростниковый* - антисептическое средство, оказывающее губительное действие на патогенные микроорганизмы и препятствующее нагноению.

*Мирра* - оказывает противовоспалительное и антисептическое действие при хронических, вялотекущих процессах бактериальной и вирусной этиологии, общеукрепляющее действие, оптимизирует периферический кровоток, способствует быстрой регенерации тканей при трофических язвах, свищах, являющихся ранах, противогеморроидальное средство.

*Мелия азедарах* - содержит природные антибиотики, медь, стерин, алкалоид маргозин и другие вещества, обладает ранозаживляющими, противовоспалительными свойствами.

*Драцена* - способствует очищению организма, сжигая шлаки, выводя соли, тонизируя сосуды. Драцена успокаивает любые боли в костях и мышцах, содействует быстрому заживлению ран на коже.

*Кассия узколистная* – обладает слабительными свойствами, повышает моторную функцию кишечника, особенно толстого.

*Янтарное масло* - используют против нагноений, природный антисептик, обладающий мощными ранозаживляющими свойствами, во время его применения раны стягиваются в минимальные сроки, причем без образования грубых рубцов.

*Ветивер* - способствует глубокому расслаблению, эффективно справляется с мышечными и другими видами боли, помогает пищеварительной системе.

**Фармакокинетика:**

Не изучена.

**Показания к применению:**

- сухой и кровоточащий геморрой;
- уменьшения геморроидальных узлов, остановка кровотечения;
- зуд и боли, связанные с воспалением узлов или застоем крови в венах прямой кишки и малого таза;
- запоры;
- анальные трещины и свищи;

**Противопоказания:**

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- не рекомендуется использование препарата при лечении детей в возрасте до 12 лет.

Проктофаст следует принимать внутрь, 1-2 таблетки с достаточным количеством воды 2 раза в день после еды или по указанию врача.

Для достижения наилучшего результата употребляйте как можно больше клетчатки, регулярно делайте физические упражнения, употребляйте много воды (в среднем 5 литров в сутки).

Поддерживайте оральную и анальную гигиену, постарайтесь снизить вес, избегайте употребления алкоголя и табака, а также используйте крем Проктофаст.

**Побочные действия:**

Возможны аллергические реакции, покраснение, зуд в области анального отверстия.

**Передозировка:**

В настоящее время о случаях передозировки не сообщалось.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не наблюдалось.

**Особые указания:**

Облегчение признаков геморроя и стойкий терапевтический эффект развивается при регулярном использовании препарата.

Перед применением рекомендуем проконсультироваться с врачом. Не следует превышать рекомендуемую ежедневную дозу без указания врача. В случаях кровотечений или отсутствия терапевтического эффекта следует срочно проконсультироваться с врачом.

**Форма выпуска:**

60 таблеток покрытых пленочной оболочкой в пластиковой бутылке. Одна бутылка вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C, в местах недоступных для детей.

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.