

СЕНН

Торговое название: Сенн.

Международное непатентованное название: Сеннозиды А и В.

Лекарственная форма: Таблетки для приема внутрь.

Состав: каждая таблетка содержит:

Сухой экстракт листьев сенны 93,33 мг

с содержанием суммы кальциевых солей сеннозидов А и В в пересчете на сеннозид В 13,5 мг

Разрешенные консерванты и вспомогательные вещества q.s.

Фармакотерапевтическая группа: Растительное слабительное средство.

Код АТХ: А06АВ06

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика: Слабительное средство растительного происхождения. Оказывает слабительное действие, наступающее через 8-10 ч. Слабительный эффект обусловлен воздействием на рецепторы толстого кишечника, усиливающим перистальтику.

Фармакокинетика: Антрохиноновые слабительные всасываются незначительно, начиная с тонкой кишки. В толстой кишке большее количество сеннозидов гидролизуется под воздействием ферментов кишечной флоры в фармакологически активные свободные антрахиноны. Всосавшиеся антрахиноны метаболизируются в печени. Антрахиноны и их метаболиты выводятся почками и толстым кишечником. Системная биодоступность сеннозидов А с 5%. Слабительное действие наступает через 8 - 10 часов после приема.

Показания к применению:

- запоры, вызванные гипотонией и вялой перистальтикой толстого кишечника;

- регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах.

Противопоказания:

- спастический запор;

- кишечная непроходимость;

- боли в животе неясного генеза;

- ущемленная грыжа;

- острые воспалительные заболевания брюшной полости;

- перитонит;

- желудочно-кишечные и маточные кровотечения;

- цистит;

- нарушения водно-электролитного обмена;

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью назначают при заболеваниях печени и/или почек, при беременности, в период грудного вскармливания, при состояниях после полостных операций.

Беременность и период грудного вскармливания:

С осторожностью следует назначать Сенн при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы:

Внутрь, 1 раз в сутки, вечером перед сном, запивая водой или каким-либо напитком.

Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке 1 раз в сутки. При отсутствии эффекта дозу можно увеличить до 2-3 таблеток.

Детям в возрасте 6-12 лет назначают по 1/2 таблетке 1 раз в сутки и при необходимости увеличивают дозу до 1-2 таблетки.

В процессе подбора одну и ту же дозу следует принимать в течение нескольких дней и постепенно увеличивать ее на 1/2 таблетки. Если после достижения максимальной дозы в течение 3 дней дефекация не происходит, необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: возможны коликообразные боли в животе, метеоризм; при длительном применении, особенно в высоких дозах, возможны отложение меланина в слизистой оболочке кишечника, тошнота, рвота, диарея.

Со стороны обмена веществ: при длительном применении, особенно в высоких дозах, возможны нарушения водно-электролитного обмена, отложение меланина в слизистой оболочке кишечника.

Со стороны мочевыделительной системы: при длительном применении, особенно в высоких дозах, возможны альбуминурия, гематурия, обесцвечивание мочи.

Со стороны ЦНС: при длительном применении, особенно в высоких дозах, возможны судороги, утомляемость, спутанность сознания.

Дерматологические реакции: при длительном применении, особенно в высоких дозах, возможна кожная сыпь.

Со стороны сердечнососудистой системы: при длительном применении, особенно в высоких дозах, возможен сосудистый коллапс.

Передозировка:

Симптомы: диарея, ведущая к обезвоживанию.

Лечение: увеличение потребления жидкости, как правило, достаточно, чтобы компенсировать потерю жидкости и электролитов. В некоторых случаях требуется восполнение потери жидкости и электролитов с помощью в/в инфузий плазмозаменителей.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При длительном применении лекарственного средства Сенн в высоких дозах, возможно усиление действия сердечных гликозидов и влияние на действие антиаритмических препаратов, в связи с возможностью развития гипокалиемии.

При одновременном применении с тиазидными диуретиками, ГКС, препаратами корня солодки увеличивается риск развития гипокалиемии.

Особые указания:

Не рекомендуется применять таблетки Сенн более 2 недель.

После приема препарата моча может приобретать желто-коричневый или красно-сиреневый цвет.

Использование в педиатрии: Препарат применяют у детей в возрасте 6 лет и старше.

Влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами:

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами.

Форма выпуска:

20 таблеток в каждом блистере ПВХ. 25 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.