

ТРАВМЕД

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Травомед.

Международное непатентованное название: комбинированный препарат.

Лекарственная форма: сироп для приема внутрь.

Состав: каждые 5 мл содержит:

Имбирь лекарственный	165 мг;
Черный перец	165 мг;
Перец длинный	165 мг;
Адатода сосудистая, юстиция адатода	325 мг;
Паслён чёрный	165 мг;
Базилик тонкоцветный / Туласи	75 мг;
Солодка гладкая	75 мг;
Куркума длинная	75 мг;
Фиалка душистая	50 мг;
Куркума цидоарий	50 мг;
Мята перечная	3 мг;
Хлорид аммония	35 мг;
Мёд пчелиный	2 г;
Ароматизированная сиропная основа	q.s.;
Разрешенные консерванты и вспомогательные вещества	q.s.;

Код АТХ: R05CA.

Фармакологическая группа: Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Фармакологические свойства:

Препарат оказывает отхаркивающее действие, разжижает мокроту и уменьшает ее вязкость, тем самым способствует лучшему её отхождению.

Sunthi (Имбирь лекарственный) - корневища имбиря лекарственного применяют при лечении хронического кашля, рецидивов кашля, простуды.

Marich (Черный перец) - Плоды перца черного обладают кардиопротекторным действием.

Pippali (Перец длинный / Пиппали) - плоды перца длинного обладают противокашлевым действием, используется для лечения бронхита и других заболеваний дыхательной системы.

Vasa (Адатода сосудистая, юстиция адатода) - применяют при хроническом бронхите, для облегчения кашля, астмы, туберкулеза и одышки.

Kantkari (Паслён чёрный) - применяется при снятии жара, облегчения кашля, астме.

Применяется также при хроническом кашле у детей.

Tulasi (Базилик тонкоцветный / Туласи) - эффективен против рвоты, тошноты, запора, депрессии, коклюша, головной боли и лихорадки.

Mulethi (Солодка гладкая/Солодка голая) - тонизирующее средство, разжижает и выводит мокроту из легких и бронхов, облегчает отхаркивание мокроты, снимает приступы кашля.

Haridra (Куркума длинная) - обладает противовоспалительным, антисептическим, антибактериальным и антиоксидантным действием, используется при лечении боли в горле, мгновенно облегчает кашель. Также используется как стимулирующее и тонизирующее средство.

Vanapasha (Фиалка душистая) - применяется для лечения бронхита, воспаления горла и коклюша. Обладает противовоспалительным, мочегонным, слабительным и противомикробным свойствами. А также ее применяют в качестве хорошего обезболивающего и успокоительного средства.

Kachur (куркума цидоарий) - применяется как отхаркивающее средство, при лихорадке и кашле.

Укрепляет голосовые связки, увеличивает силу голоса, улучшает его качество и тембр.

Следовательно, она часто используется певцами.

Pudina Satva (Мята перечная) - Оказывает смягчающее, противовоспалительное действие при охриплости и потере голоса. Охлаждающее действие мяты может быть полезным при повышенной температуре.

Navsagar (хлорид аммония) - действует как мочегонное и отхаркивающее средство, облегчая

выведение слизи из бронхов и трахеи при кашле.

Мед - обладает антибактериальным действием, уничтожая грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы. Им лечат ангину, ларингит, бронхит, астму, затяжной кашель.

Фармакокинетика:

Фармакокинетика препарата не изучена.

Показания к применению:

- в качестве эффективного отхаркивающего средства, разжижающего мокроту;
- при сухом, мокром и аллергическом кашле;
- эффективное средство против охриплости голоса, боли в горле и при астме;
- для снятия раздражения носа и горла.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- хроническая сердечная недостаточность;
- почечная и/или печеночная недостаточность;
- беременность, период грудного вскармливания;
- детский возраст (до 3 лет).

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Дети: по 1 чайной ложке 2-3 раза в день.

Взрослые: 2 чайные ложки 2-3 раза в день в зависимости от возраста или согласно предписанию врача.

Курс лечения -2-3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочные действия:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата в виде кожной сыпи.

Передозировка:

Симптомы: понос, рвота.

Лечение: прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует избегать одновременного применения с другими противокашлевыми средствами и препаратами, снижающими образование мокроты. Применение одновременно с соответствующими антибиотиками усиливает эффект.

Особые указания:

Перед применением препарат рекомендуется тщательно взболтать.

Форма выпуска:

Сироп в флаконе 100 мл вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, не доступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.