

# ВАВЕГАН

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Вавеган.

**Международное непатентованное название:** Повидон-йод.

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения.

**Состав:**

Повидон-йод USP 10% w/w;  
(содержание йода 1 % w/w  
водосмываемая основа).

**Фармакотерапевтическая группа:** Дерматотропные средства. Йодсодержащие антисептические препараты.

**Код АТХ:** D08AG02.

**Фармакологические свойства:**

**Фармакодинамика:**

Повидон-йод представляет собой координационный комплекс поливинилпирролидон-йод, в котором концентрация активного йода составляет 0,1 – 1%. Оказывает антисептическое и дезинфицирующее действие.

Механизм действия связан с медленным высвобождением из поливинилпирролидона атомарного йода и йодид-ионов, которые взаимодействуют с аминогруппами трансмембранных транспортных белков бактериальной стенки и белков-ферментов образуя йодамины. Это приводит к потере белком его четвертичной структуры и утрате структурной, транспортной и каталитической функции.

Повидон-йод обладает широким спектром противомикробного действия. Высокоактивен в отношении грамположительных бактерий *Streptococcus* spp. (в том числе *S. mutans*, *S. sanguis*), *Staphylococcus* spp. (в том числе *S. aureus*), *Bacillus subtilis* (вегетативные формы и споры), *Propionibacterium acne*, *Clostridium* spp., грамотрицательных бактерий *Escherichia* spp., *Klostridium* spp., *Proteus* spp., *Pseudomonas* spp., *Shigella* spp., *Salmonella* spp., грибов *Aspergillus* spp., *Candida* spp., *Microsporium* spp., *Penicillium* spp., *Nocardia* spp., *Trichophyton* spp., *Actinomyces* spp. (в том числе *A. viscosus*, *A. naeslundii*), вирусов и некоторых простейших.

На месте применения повидон-йода образуется тонкий окрашенный слой ткани, который сохраняется до тех пор, пока не высвободится весь йод. Благодаря наличию поливинилпирролидона активный йод высвобождается из препарата медленно и постепенно, оказывая бактериальное действие на микроорганизмы, без раздражающего и прижигающего действия на ткани. В присутствии белков крови и гноя противомикробная активность повидон-йода несколько снижается.

**Фармакокинетика:**

Поливинилпирролидон относится к йодофорам, которые связывают йод. При контакте с кожей или слизистыми оболочками йод высвобождается постепенно и равномерно. При наружном применении абсорбируется менее 2% препарата. После абсорбции поступает в печень, где в основном и происходит элиминация, связанная с медленным высвобождением йодид-иона из комплекса с поливинилпирролидоном. Период полуэлиминации повидон-йода, определяемый по времени разрушения комплекса йод-поливинилпирролидон, составляет около 7 ч и уменьшается в случае контакта повидон-йода с белком некротизированных тканей или гноем.

**Показания к применению:**

- обработка ран, ожогов, трофических и варикозных язв, пролежней;
- острые и хронические вагиниты (смешанного и неспецифического генеза);
- в составе комбинированной терапии острых и хронических бактериальных и кандидозных инфекций кожи.

**Противопоказания:**

- гиперчувствительность к йоду и другим компонентам лекарственного средства;
- противопоказано пациентам с заболеваниями щитовидной железы (в частности узловой, коллоидный, эндемический зоб и тиреодит Хашимото);
- тиреотоксикоз;
- герпетический дерматит Дюринга;
- аденома щитовидной железы;
- одновременная терапия радиоактивным йодом;
- период новорожденности;
- детский возраст до 2-х лет;
- беременность (II-III триместр) и период лактации.

**Беременность и лактация:**

Применение Вавеган мази не рекомендуется с 2-3-го месяца беременности и в период лактации (грудного вскармливания). При необходимости в этих случаях лечение возможно под индивидуальным медицинским контролем.

**Способ применения и дозы:**

Препарат для наружного применения.

Мазь наносят тонким слоем, не втирая, на очаг поражения. Кратность применения мази 1 - 2 раза в сутки.

Продолжительность терапии 7 - 14 дней.

Пораженная зона должна быть очищена и осушена заранее перед применением мази Вавеган, так как ее эффективность в присутствии различных органических веществ, таких как кровь и гной, снижается, поскольку они окисляются и связывают активный йод.

*При гнойных хирургических ранах и инфицированных ожогах* мазь наносят под марлевую повязку, которую следует менять после полного обесцвечивания марли, но не ранее чем через 4 ч.

*При свежих термических и химических ожогах I - II степени* мазь наносят тонким слоем под марлевую повязку. После полного обесцвечивания, пропитанной мазью повязки – ее меняют, но не ранее чем через 4 ч. До образования струпа, нижний слой повязки удаляют.

*При трофических и варикозных язвах* препарат применяют в виде мазевых повязок. Кожу вокруг раны моют теплой водой с мылом, после чего обрабатывают цинковой мазью. На рану наносят Вавеган мазь слоем 2 - 3 мм, после чего рыхло укрывают 3 слоями марли. Перевязки производят 1 - 2 раза в сутки (после обесцвечивания пропитанных мазью марлевых салфеток), при этом нижний слой марли не удаляют с поверхности раны, а мазь наносят поверх нее. Через 4 - 7 дней назначают общую или местную ванну, после

чего лечение продолжают.

**Побочные действия:**

**Аллергические реакции:** реакции повышенной чувствительности к препарату; требующие отмены препарата проявления аллергической реакции - гиперемия, жжение, зуд, отек, боль.

**Передозировка:**

**Симптомы:** при чрезмерном всасывании с поверхности кожи и слизистых возможны явления йодизма, кожные поражения, высыпания, угри, кожный зуд.

**Лечение:** отмена препарата, обмывание кожи и слизистых теплой питьевой водой, местное применение подсушивающих лосьонов и болтушек с оксидом цинка. Специфическим антидотом йодид - ионов является хлорид натрия, который назначают в дозе 10 - 20 г в сутки с большим количеством воды (3 – 5 л в сутки) для ускорения элиминации йодид - ионов.

**Лекарственные взаимодействия:**

Не рекомендуется комбинация перекиси водорода и препарата Вавеган для обработки ран, поскольку это негативно влияет на эффективность обоих антисептиков. Так же нельзя использовать комбинацию повидон-йода с препаратами, в состав которых входят таулоридин, ферменты или серебро. При смешивании с ртутьсодержащими препаратами образуется щелочной йодид ртути, поэтому данная комбинация не допускается. Низкая эффективность препарата может компенсироваться увеличением дозировки, так как повидон-йод вступает в реакции с органическими ненасыщенными комплексами и протеинами. Не рекомендуется назначать Вавеган пациентам, принимающим литийсодержащие средства. Нужно избегать продолжительного использования препарата на больших площадях кожи и слизистых участках.

**Особые указания:**

Пациентам с нарушением функций щитовидной железы необходимо ограничить обрабатываемую поверхность или уменьшить длительность контакта повидон-йода с кожей. В случае развития признаков гипертиреоза на фоне применения Вавеган мази необходимо обследование щитовидной железы. У новорожденных, а так же детей раннего возраста необходимо избегать применения йода в больших дозировках, так как их кожные покровы имеют высокий порог проницаемости (выше риск гипертиреоза или повышенной чувствительности к повидон-йоду).

С осторожностью назначают средство пациентам с недостаточностью функций почек, особенно при необходимости регулярного использования препарата Вавеган.

**Форма выпуска:**

Мазь для наружного применения 20 г в тубе с пластиковой крышкой, вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей. Не замораживать.

**Срок хранения:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.