

# ЮНИФЕН

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

**Торговое название:** Юнифен.

**Международное непатентованное название:** Ибупрофен.

**Лекарственная форма:** супензия для приема внутрь.

**Состав:** каждые 5 мл супензии содержат:

активное вещество: Ибупрофен 100 мг.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Нестероидное противовоспалительное средство (НПВС).

**Код ATХ:** M01AE01.

**Фармакологическое действие:**

**Фармакокинетика:**

Ибупрофен - производное фенилпропионовой кислоты и принадлежит группе нестероидных противовоспалительных лекарственных средств.

Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Механизм действия связан с ингибацией синтеза и/или освобождения простагландинов.

**Фармакокинетика:**

Ибупрофен всасывается из пищеварительного тракта примерно на 80%. Пища не влияет на всасывание ибупрофена. Концентрация препарата увеличивается пропорционально дозе. Максимальная концентрация препарата в сыворотке крови достигается через 45 мин – 1 час после перорального приема.

Ибупрофен более чем на 99% связывается с белками крови, в основном с альбуминами. Объем распределения – 6,65-8,88 литра. В суставные сумки препарата проникает сравнительно медленно, максимальная концентрация наблюдается через 5-6 часов после приема. Выведение ибупрофена из суставной сумки происходит медленно, в том числе из-за сильного связывания с альбуминами. Концентрация препарата в синовиальной жидкости сохраняется в течение 80-285 минут, после чего медленно снижается.

Ибупрофен метаболизируется в печени с образованием 4 метаболитов. В виде неактивных метаболитов выводится из организма в основном через почки. В течение 24 часов приятия доза ибупрофена выводится полностью. Небольшое количество ибупрофена выделяется с калом. Период полувыведения ибупрофена после одноразового приема дозы 200 мг составляет 1,93 часа, дозы 400 мг – 1,78-2,31 часа, при многократном приеме – 2-2,5 часа. Считают, что у детей период полувыведения ибупрофена не отличается значительно от величины, установленной для взрослых.

**Показания к применению:**

- в качестве жаропонижающего средства при гриппе, острых респираторных заболеваниях, детских инфекциях, инфекционно-воспалительных заболеваниях и постстривиочных реакциях сопровождающихся повышением температуры тела;
- препарат используют как обезболивающее средство при болевом синдроме слабой или умеренной интенсивности, в том числе: головной боли, боли в горле, зубной боли, мигрени, невралгиях, ушной боли, при растяжениях и других видах боли.

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к ибупрофену, ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП, а также к другим компонентам препарата;
- бронхиальная астма, крапивница, ринит, спровоцированный приемом ацетилсалициловой кислоты (салцилатами) или другими НПВП;
- наличие у ребенка язвенного поражения желудочно-кишечного тракта;
- активное желудочно-кишечное кровотечение;
- воспалительные заболевания кишечника;
- подтвержденная гипокалиемия;
- заболевания крови: гипокоагуляция, лейкопения, гемофилия;
- почечная или печеночная недостаточность;
- снижение слуха.

**С осторожностью:**

- Следует проконсультироваться с врачом прежде, чем давать ребенку Инфорин супензию, если ребенок:
- принимает другие болеутоляющие лекарства;
  - имеет в анамнезе: язвенную болезнь, гастрит, язвенный колит, кровотечения ЖКТ;
  - страдает заболеваниями печени или почек;
  - при наличии Н.р.р.;
  - принимает непрямые антикоагулянты (препараты для приема внутрь, снижающие свертываемость крови), препараты для снижения артериального давления, глюкокорикостероиды, антиагреганты, дурнушки (препараты для усиления мочеотделения), препараты лития, метотрексата.

**Способ применения и дозы:**

Перед применением хорошоенько взболтайте супензию.

Использование мерного шприца:

Повторять процедуру всегда, когда принимаете препарат.

- Плотно вставьте шприц в горлышко флакона.
- Хорошо взболтайте супензию.
- Переверните флакон вверх дном и плавно потяните поршень вниз, набирая супензию в шприц до нужной отметки.
- Верните флакон в исходное положение и выньте шприц, аккуратно поворачивая его.



- Поместите шприц в ротовую полость ребенка и медленно нажимайте на поршень, плавно выпуская супензию.
- После использования промойте шприц в теплой воде и высушите его в недоступном для ребенка месте.

**Постиммунизационная лихорадка:** 2,5 мл детям в возрасте от 3 месяцев и выше (весом более 5 кг), при необходимости, еще 2,5 мл через 6 часов. Не применяйте более 5 мл в течение 24 часов.

**Лихорадка (жар) и боль:** дозировка для детей зависит от возраста и массы тела ребенка. Максимальная суточная доза не должна превышать 20-30 мг на кг массы тела ребенка в сутки. Разовая доза составляет 5-10 мг/кг массы тела ребенка 3-4 раза в сутки.

**Дети в возрасте 3-6 месяцев** (вес ребенка более 5 кг): по 2,5 мл 3 раза в течение 24 часов.

**Дети в возрасте 6-8 месяцев** (средний вес ребенка 5-6 кг): по 2,5 мл 3 раза в течение 24 часов.

**Дети в возрасте 9-11 месяцев** (средний вес ребенка 7-9 кг): по 2,5 мл 3-4 раза в течение 24 часов.

**Дети в возрасте 1-3 года** (средний вес ребенка 10-15 кг): по 5 мл 3 раза в течение 24 часов.

**Дети в возрасте 4-5 лет** (средний вес ребенка 16-19 кг): по 7,5 мл 3 раза в течение 24 часов.

**Дети в возрасте 6-9 лет** (средний вес ребенка 20-29 кг): по 10 мл 3 раза в течение 24 часов.

**Дети в возрасте 10-12 лет** (средний вес ребенка 30-43 кг): по 15 мл 3 раза в течение 24 часов.

Между приемом препарата следует выдерживать минимум 6-8 часов интервал (или как минимум 4 часовный интервал при необходимости).

Препарат не подходит малышам до 3-месячного возраста, только по указанию вашего врача.

**Предупреждение:** не превышать указанную дозу!

**Продолжительность лечения:**

Не более 3-х дней в качестве жаропонижающего;  
Не более 5-ти дней в качестве обезболивающего. Если лихорадка (температура) сохраняется, посоветуйтесь с врачом.

Если у детей младше 6 месяцев сохраняются симптомы после 24 часов приема препарата, следует вызвать врача.

**Побочные действия:**

При применении препарата побочные действия наблюдаются редко, однако возможно появление следующих побочных эффектов:

**Со стороны желудочно-кишечного тракта:** тошнота, рвота, ощущение дискомфорта, или боли в эпигастрии, слабительный эффект, возможно возникновение зернисто-язвенных поражений, кровотечений.

**Аллергические реакции:** кожная сыпь, зуд, крапивница, обострение бронхиальной астмы, ангина-виротический шок, анафилактоидные реакции, анафилактический шок, бронхоспазм, лихорадка, многоформная экссудативная эритема (в том числе синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла)

**Со стороны нервной системы:** головная боль, головокружение, психомоторное возбуждение, бессонница

**Сердечно-сосудистая система:** тахикардия, повышение артериального давления.

**Со стороны органов кроветворения:** анемия, тромбоцитопения, агрегантоцитоз, лейкопения.

**Со стороны мочевыделительной системы:** нарушение функции почек, цистит.

**Передозировка:**

Применение детям более 400 мг/кг препарата может вызвать появление симптомов интоксикации. У взрослых эффект дозы менее выражен.

Период полувыведения при передозировке составляет 1,5-3 часа.

Если принять дозу больше рекомендованной, сразу обратитесь к своему врачу!

В зависимости от уровня передозировки будут принятые соответствующие меры.

**Симптомы:** у большинства пациентов, применение значительного количества нестероидных противовоспалительных средств вызвало только тошноту, рвоту, боль в эпигастральной области, очень редко – диарею. Может также возникнуть шум в ушах, головная боль и кровотечение из пищеварительного тракта. При более тяжелом отравлении могут возникнуть токсические поражения центральной нервной системы в виде сонливости, иногда – нервного возбуждения и дезориентации или комы. Иногда у пациентов наблюдаются судороги.

При тяжелом отравлении может возникать метаболический ацидоз: протромбиновый индекс может быть повышенным, возможно, вследствие влияния на факторы свертываемости крови. Может возникать острая почечная недостаточность и поражения печени. У больных бронхиальной астмой может наблюдаться обострение течения заболевания.

**Лечение:** может быть симптоматическим и дополнительным, а также включать очищение дыхательных путей и наблюдение за сердечными симптомами и показателями жизненно важных функций до нормализации состояния. Рекомендовано пероральное применение активированного угля в течение 1 часа после приема потенциально токсического количества препарата. При частых или длительных судорогах следует применять дизазепал или лоразепал внутривенно. Для лечения обострения бронхиальной астмы следует применять бронхолитические средства.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препарат следует принимать с осторожностью при одновременном приеме со следующими лекарственными препаратами:

Антикоагулянтами (ибупрофен усиливает их действие);

Глюкокортикоидами и НПВП, (ибупрофен повышает риск развития нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта);

Циклоспорином, сердечными гликозидами, препаратами литием, метотрексатом, фенитоином, зидовудином, пеницилламином (ибупрофен может усиливать токсические эффекты указанных препаратов);

Диуретиками и антигипертензивными средствами (одновременный прием может снизить эффективность препаратов).

Магалдрат (антанта) незначительно ускоряет всасывание ибупрофена и увеличивает его концентрацию в сыворотке.

**Особые указания:**

Не следует принимать препарат совместно с другими НПВП. Во время длительного лечения необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени и почек. При появлении симптомов гастроэзофагодуоденоскопии, общий анализ крови (определение гемоглобина), анализ кала на скрытую кровь. При необходимости определения 17 - кетостероидов препарат следует отменить за 48 часов до исследования.

**Формы выпуска:**

Супензия для приема внутрь во флаконе 100 мл. Один флакон вместе с инструкцией по применению и мерным шприцем в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.